

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre Químico (IUPAC) N/A

No. CAS N/A

Sinónimos N/A

Nombre comercial Engorde PPK
Formulación (%)

Presentación para uso agrícola 1, 10 y 20 Kg

Nitrógeno Total | N 10.00 %
Fósforo | P2O5 21.00 %
Potasio soluble | K2O 36.00 %
Magnesio | Mg 0.15 %
Boro | B 200 ppm
Cobre | Cu 100 ppm
Quelato de manganeso | Mn 56 ppm

Quelato de zinc | Zn 162 ppm
Molibdeno | Mo 10 ppm
Ac. policarboxílicos 0.30 %
Excipiente c.b.p

Estructura química N/A

Fórmula química N/A

Peso molecular N/A

Tipo de producto Fertilizante con alto contenido de potasio| bioestimulante

Uso foliar


Clasificación Especialidades

Presentaciones comerciales: 1, 10 y 20 Kg

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Sólido color amarillo
Pureza: 99.9%
Punto de ebullición: 91-98° C
Impurezas: 0.001% máx.
Solubilidad: 100% soluble en agua
pH: 4.6
Disolución: 0.5 g/mL
Temperatura Óptima de aplicación 20-25° C

PELIGROSIDAD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Engorde PPK es un producto líder dentro de nuestra gama de fertilizantes foliares de última generación, el cual tiene una alta concentración de Potasio, esta enriquecido con micro elementos en forma de quelatos, polisacáridos y policarboxilos, que lo convierten en un producto único en el mercado.

Engorde PPK al aplicarlo induce mayor floración y fructificación por ende mayor producción y calidad de frutos.

EFFECTOS GENERADOS POR EL PRODUCTO

Incrementa la calidad de frutos
Intensifica la actividad enzimática y el balance armónico entre los nutrientes de las plantas.
Incrementa la floración y fructificación.

CULTIVOS Y DOSIS

Cultivo	Dosis Kg/ha	Época de aplicación
Tomate, Chile, Bell Peper y Tomatillo Melón, Pepino, Calabaza, Berengena Cabocho, Papa y Camote	1 a 3	En prefloración, floración y fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Fresa, Zazamora, Arándanos y Frambuesa	1 a 3	En prefloración, floración y fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Aguacate, Durazno, Pera, Mango, Ciruelo, Piña, Guayaba, Manzana Limón Persa, Naranja, Limón Mexicano y Limón Italiano	1 a 3	En prefloración, floración y fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Vid y Uva de mesa	1 a 2	En prefloración, floración y fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Caña de azúcar	2 a 4	Durante todas las etapas fenológicas, repetir cada 20 días
Ajo, Cebolla, Col Brócoli, Coliflor, Ejote, Chicharo, Soya, Garbanzo, Frijol, Haba y Lenteja	1 a 2	Durante todas las etapas fenológicas, repetir cada 15 o 20 días
Plátano y Banano	2 a 4	Iniciar aplicaciones en prefloración y floración. Realizar aplicaciones cada 20 días.
Café	1 a 3	En prefloración, floración y fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.

INCOMPATIBILIDAD

No es fitotóxico a los cultivos indicados en las dosis sugeridas. Compatible con todos los productos agroquímicos y nutrientes vegetales excepto con productos de fuerte reacción alcalina.