

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre Químico (IUPAC) N/A

No. CAS N/A

Sinónimos N/A

Nombre comercial K super
Formulación (%)

Presentación para uso agrícola 500 mL; y 1, 4, 20 y 50 100, 200 y 1000 L

Potasio | K₂O 40.00 %
Aminoácidos 10.00 %
Polisacáridos 5.00 %
Vitaminas 2.00 %
Excipiente c.b.p

Estructura química N/A

Fórmula química N/A

Peso molecular N/A

Tipo de producto Fertilizante líquido con alta concentración de potasio

Uso foliar

Clasificación Especialidad

Presentaciones comerciales: 500 mL; y 1, 4, 20 y 50 100, 200 y 1000 L

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Líquido color morado

Pureza: 99.9%

Punto de ebullición: 90- 97° C

Impurezas: 0.001% máx.


Solubilidad: 100 % soluble en agua

pH: 4.85 a 5.25

Densidad: 1.246 a 1.286 g/mL

Temperatura Óptima de aplicación 20-25° C

PELIGROSIDAD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fertilizante líquido foliar con alto contenido de potasio, recomendado en los cultivos que tienen requerimientos mayores de este elemento. La aplicación de K-Super promueve el incremento de producción y la calidad de los frutos cosechados, impartiendoles además resistencia al frío y a las enfermedades. Se recomienda aplicar K-super después de la floración y durante la formación de semillas, tubérculos y frutos. En cultivos como fresa, zarzamora, tomate, chile, cebolla y papa, aplicado en dosis adecuadas, influye en la síntesis de almidón produciendo frutos más grandes y de mejor calidad.

EFFECTOS GENERADOS POR EL PRODUCTO

Aumenta el tamaño y uniformidad de frutos.
 Mayor producción y calidad de frutos.
 Al aplicar este producto imparte a la planta y al fruto resistencia al frío y a las enfermedades.
 Previene y corrige las deficiencias de potasio y nitrógeno.

CULTIVOS Y DOSIS

Cultivo	Dosis L/ha	Época de aplicación
Tomate, Chile, Bell pepper y Tomatillo	1.0	Desde prefloración, floración, amarre y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días y siempre después de cada corte.
Sandía, Melón, Pepino y Calabaza	1.0 a 2.0	Desde prefloración, floración, amarre y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 10 o 15 días y siempre después de cada corte.
Papa y camote	1.0 a 2.0	Durante el desarrollo vegetativo y desde el inicio de la formación del tubérculo, realizar aplicaciones cada 20 días.
Fresa, Zarzamora, Arándanos y Frambuesa	1.0 a 2.0	Desde prefloración, floración y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 10 o 15 días y si es posible después de cada corte.
Aguacate	1.0 a 2.0	Desde prefloración, floración y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 20 o 25 días.
Durazno, Pera, Mango, Ciruelo, Piña, Guayaba y Manzana	1.0 a 2.0	Desde prefloración, floración y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 20 o 25 días.
Vid y Uva de mesa	1.0 a 2.0	En desarrollo vegetativo, al inicio de la brotación y en fructificación, realizar aplicaciones cada 10 o 15 días.
Limón persa, Naranja, Limón Mexicano y Limón Italiano	1.0 a 2.0	Durante el desarrollo vegetativo, a la caída del pétalo y en plena fructificación. Realizar aplicaciones cada 25 o 30 días.
Caña de azúcar	1.0 a 2.0	Durante todo el desarrollo vegetativo. Realizar aplicaciones cada 30 días.
Ajo y Cebolla	1.0	Iniciar al segundo par de hojas verdaderas y durante todo el ciclo. Realizar aplicaciones cada 25 o 30 días.
Col, Brócoli y Coliflor	1.0	Durante el desarrollo vegetativo, hasta el inicio de la inflorescencia. Realizar aplicaciones cada 25 o 30 días.
Ejote y chícharo	1.0	Desde prefloración, floración y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días y siempre después de cada corte.
Soya y Garbanzo	1.0	Desde prefloración, floración y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días y siempre después de cada corte.
Frijol, Haba y Lenteja	1.0	Desde prefloración y durante la fructificación. Realizar aplicaciones cada 20 días.
Plátano y Banano	1.0 a 2.0	Durante el desarrollo y en la formación de dedos. Aplicaciones cada 20 o 25 días.
Café	1.0	Desde prefloración y durante la formación de grano, realizar aplicaciones cada 20 o 25 días.
Trigo, avena, arroz y cebada	1.0	Desde amacollamiento y fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Ornamentales	1.0	Al inicio de la brotación y después del pinch, realizar aplicaciones cada 10 a 15 días.
Algodón	1.0	En prefloración y durante fructificación. Realizar aplicaciones cada 20 o 25 días.
Chía	1.0	En prefloración y fructificación. Realizar aplicaciones cada 20 días.
Agave	1.0	Durante todo el ciclo. Realizar aplicaciones cada 25 o 30 días.
Chile habanero y Chile manzano	1.0	En prefloración, floración y fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Césped deportivo	1.0	Durante todas las etapas fenológicas. Realizar aplicaciones cada 20 días.
Berenjena	1.0	En prefloración, floración y fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Cabocha	1.0	En prefloración, floración y fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.

INCOMPATIBILIDAD

No es fitotóxico a los cultivos indicados en las dosis sugeridas. Compatible con todos los productos agroquímicos y nutrientes vegetales excepto con productos de fuerte reacción alcalina.