

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre Químico (IUPAC) N/A

No. CAS N/A

Sinónimos N/A

Nombre comercial Trikel
Formulación (%)

Presentación para uso agrícola 900 g, 10 y 20 Kg

Boro B	12.00 %
Zinc Zn	12.00 %
Molibdeno Mo	0.50 %
Aminoácidos	5.00 %
Polisacáridos	5.20 %

Estructura química N/A

Fórmula química N/A

Peso molecular N/A

Tipo de producto Fertilizante concentrado en boro, zinc y molibdeno

Uso foliar

Clasificación Especialidades

Presentaciones comerciales: 900 g, 10 y 20 Kg

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Sólido color blanco

Pureza: 99.9%

Punto de ebullición: 88- 97° C

Impurezas: 0.001% máx.


Solubilidad: 100% soluble en agua

pH: 5.4 a 5.8

Disolución: 0.4 g/L

Temperatura Óptima de aplicación 20-25° C

PELIGROSIDAD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Trikel es un fertilizante foliar formulado con boro, zinc y molibdeno. Eficaz para prevenir y corregir deficiencias de estos microelementos. Es adecuado para usar en cultivos en floración o en formación de fruto cuando la actividad metabólica se encuentra al máximo. Los aminoácidos y polisacáridos contenidos en este producto incrementan la absorción y potencializan su efecto.

EFFECTOS GENERADOS POR EL PRODUCTO

Aumenta el amarre de flores y posteriormente de frutos.
Incrementa el vigor de los cultivos
Intensifica la actividad enzimática y el balance armónico entre los nutrientes de las plantas.
Incrementa el desarrollo y mejora su metabolismo.

CULTIVOS Y DOSIS

Cultivo	Dosis Kg/ha	Época de aplicación
Aguacate	2 a 4	En frutales pequeños aplicar cada mes. En árboles grandes durante la floración y después de corte y 2 a 3 aplicaciones en fructificación
Fresa, Zarzamora, Arándanos y Frambuesa	1 a 2	Realizar aplicaciones cada 15 días durante el desarrollo vegetativo y en plena floración.
Chile, Tomate, Berenjena, Tomate de Cáscara, etc.	1 a 3	Durante el desarrollo vegetativo e inicio de floración y en formación de fruto, de 3 a 5 aplicaciones en intervalos de 15 a 20 días.
Vid	1 a 2	De 2 a 3 aplicaciones cada 15 días durante el desarrollo.
Papa y camote	2 a 4	Iniciar cuando la planta tenga 15 cm de altura y repetir cada 20 días.
Papaya, Sandía, Mango, Melón y Piña	1 a 3	Durante el desarrollo, en floración y en formación de fruto, repetir cada 20 días.
Durazno, Pera, Ciruelo y Guayaba	2 a 4	En frutales pequeños aplicar cada mes. En árboles grandes durante la floración, fructificación, 2 a 3 aplicaciones.
Ornamentales	1 a 3	Iniciar aplicaciones cuando exista suficiente follaje y repetir cada 15 días hasta inicio de cosecha.
Plátano y Cocotero	1 a 2	Durante el desarrollo vegetativo, repetir cada 20 días.
Frijol y Soya	1 a 2	Durante el desarrollo vegetativo y en floración, repetir cada 20 días.
Alfalfa	2 a 4	Durante el desarrollo vegetativo, repetir cada 20 días.
Maíz, Sorgo, Trigo, Avena, Arroz, etc.	2 a 4	Realizar 2 aplicaciones, una en desarrollo y otra en prefloración.
Caña de Azúcar	1 a 2	Aplicar cada 30 días en todas las etapas fenológicas.
Agave	1 a 2	Aplicar cada 30 días en época de temporal y cada 20 días en el ciclo otoño-invierno.

INCOMPATIBILIDAD

No es fitotóxico a los cultivos indicados en las dosis sugeridas. Compatible con todos los productos agroquímicos y nutrientes vegetales excepto con productos de fuerte reacción alcalina.